



## PRELEVEMENT ORL

### Préparation du patient

Procéder à un interrogatoire rapide du patient permettant de connaître l'indication des analyses prescrites :

- Renseignements cliniques (angine...)
- Recherche de portage (personnel de cuisine)
- Traitement en cours, absence d'antibiothérapie pouvant interférer sur les résultats...
- Installer le patient de façon à ce que la zone à prélever soit dégagée et bien éclairée.

### Matériel

- Ecouvillons avec milieu de transport pour la mise en culture et écouvillons sec pour l'examen direct.
- Abaisse-langue
- Gants à usage unique

### Règles d'asepsie

- Le préleveur utilisera du matériel à usage unique.
- Il n'ouvrira les écouvillons qu'au moment de prélever
- Il se lavera les mains avant le prélèvement ou les désinfectera avec un soluté hydro alcoolique (SHA).
- Il portera des gants à usage unique

### Types de prélèvement

- Gorge et rhino-pharynx:
  - utiliser 1 écouvillon
  - Si nécessaire, s'aider d'un abaisse-langue.
  - repérer la lésion et noter les caractéristiques (angine érythémateuse, pultacée, ulcéruse, pseudo-membraneuse...)
  - prélever sur les amygdales et leur pourtour en général. Pour la recherche de *Corynebacterium diphtheriae*, prélever en périphérie des fausses membranes.
- Nez
  - Utiliser 1 écouvillon
- Langue et gencives



- En général, prélèvement pour la recherche de *Candida* (muguet buccal)
- clinique: noter l'aspect (RAS, bouche sèche, langue dépapillée, langue noire, plaques de muguet)
- prélever 1 écouvillon
- Naso-pharynx
  - Prélèvement indiqué pour la recherche de *Bordetella pertussis* (diagnostic de la coqueluche) : consulter le laboratoire pour le mode opératoire et le matériel

LA VERSION ÉLECTRONIQUE