



Recherche de Chlamydiae	<ul style="list-style-type: none">■ Ne pas faire de toilette intime■ Recueillir le 1er jet d'urine le matin au lever dans un flacon sans conservateur. <u>Ne pas uriner dans les 2H avant le prélèvement.</u>■ Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire. Noter la date et l'heure du recueil.■ Transmettre le flacon le plus rapidement au laboratoire
Recherche de BK	<ul style="list-style-type: none">■ Recueillir le premier jet d'urine le matin au lever dans un flacon sans conservateur■ Identifier le flacon avec votre nom et prénom si cela n'a pas été fait par le laboratoire. Noter la date et l'heure du recueil.■ Transmettre le flacon le plus rapidement au laboratoire■ Renouveler le prélèvement les 2 jours suivants.
Recherche de parasites dans les urines	<ul style="list-style-type: none">■ Ne pas faire de toilette intime■ Recueillir le 1er jet d'urine le matin au lever après avoir marché pendant 30 min dans un flacon sans conservateur Attention, ne pas uriner dans les 2 heures précédant le prélèvement.■ Transmettre le flacon le plus rapidement au laboratoire
Recherche de cellules néoplasiques	<ul style="list-style-type: none">■ Faire une toilette intime■ Ne pas recueillir les 1ères urines■ Boire de l'eau et marcher pendant 30 min à 1H.■ Recueillir le 2nd jet d'urine dans un flacon* sans conservateur <u>après la marche.</u> *La quantité d'urine recueillie ne doit pas être < à 90 ml – donner un flacon pour Addis ou un pot bouchon jaune■ Transmettre le flacon le plus rapidement au laboratoire

FIN DU DOCUMENT

Document non géré