



Quand prélever ?

- En dehors de tout traitement antibiotique, sauf avis médical. Prélever la première miction du matin de préférence ou, si possible, attendre au moins 4 heures après une miction pour permettre un temps de stase suffisant dans la vessie.
- Avant la mise en place d'une antibiothérapie.
- Au minimum 7 jours après l'arrêt des antibiotiques s'il s'agit d'un contrôle après traitement (en cas de cystite).

Matériel ?



Flacon sans
conservateur.



Flacon avec conservateur.

**Attention ne pas jeter la poudre
contenue dans le pot**

Comment prélever ?

- 1) Identifier à vos nom, prénom et date de naissance le flacon.
- 2) Lavez-vous les mains.
- 3) Faire une toilette intime soignée avec une lingette désinfectante ou un savon antiseptique.
- 4) Eliminer le premier jet d'urines dans les toilettes.
- 5) Ouvrir le flacon et recueillir ensuite les urines de milieu de jet **dans les 2 flacons.**
- 6) Refermer le flacon et homogénéiser les urines par plusieurs retournements.

Conservation ?

- Conserver les échantillons à température ambiante.

Délai d'acheminement ?

**Transmettre les deux flacons au laboratoire
dans un délai inférieur à 24H**

Renseignements

Nom d'usage : Nom de naissance :

Prénom : Date de naissance :

Date du recueil : Heure de recueil :

	OUI	NON
☞ Fièvre (> 38°C) ?	☐	☐
☞ Sensations de brûlure ou de gêne en urinant?	☐	☐
☞ Sonde urinaire?	☐	☐
☞ ECBU avant opération chirurgicale?	☐	☐
☞ Pour les femmes, êtes-vous enceinte ?	☐	☐
☞ Terrain particulier :		
▪ diabète	☐	☐
▪ Immunodépression (cancer, chimiothérapie,...)	☐	☐
▪ Autre :		
☞ Prescription d'un antibiotique ?	☐	☐
Si oui, lequel ?		
☞ ECBU de contrôle après traitement antibiotique	☐	☐
Si oui, quel était l'antibiotique ?		
Date de fin du traitement		