

Etiquette
dossier

Préleveur :

Date :

Heure prélèvement :


Renseignements cliniques

Toux depuis moins de 3 semaines : oui(COQUE) non(COQHN*)

Sujet vacciné depuis plus de 3 ans : oui inconnu non(COQHN*)

Prélèvement (avant tout traitement par macrolides)

La tête du patient inclinée en arrière, insérer l'écouvillon dans la narine et pousser délicatement parallèlement au palais (cf. schéma)



Le laisser en place quelques secondes, puis le retirer avec un léger mouvement rotatif. Procéder de même pour l'autre narine (même écouvillon)

Placer l'écouvillon dans le milieu Eswab puis Casser la tige de l'écouvillon au niveau de la marque, sur le bord du tube.

Etiquette
dossier

Préleveur :

Date :

Heure prélèvement :

Renseignements cliniques

Toux depuis moins de 3 semaines : oui(COQUE) non(COQHN*)

Sujet vacciné depuis plus de 3 ans : oui inconnu non (COQHN*)

Prélèvement (avant tout traitement par macrolides)

La tête du patient inclinée en arrière, insérer l'écouvillon dans la narine et pousser délicatement parallèlement au palais (cf. schéma)



Le laisser en place quelques secondes, puis le retirer avec un léger mouvement rotatif. Procéder de même pour l'autre narine (même écouvillon)

Placer l'écouvillon dans le milieu Eswab puis Casser la tige de l'écouvillon au niveau de la marque, sur le bord du tube.

*Si analyse HN, faire signer le formulaire de consentement A2 – ENR21

*Si analyse HN, faire signer le formulaire de consentement A2 – ENR21