

Préconisations pour une analyse d'urines

Recueil d'urines à effectuer si vous n'avez pas uriné depuis au moins 4 heures.

Cas particulier des analyses d'urines sur premier jet pour la recherche de Chlamydiae, gonocoque et/ou mycoplasmes : miction matinale ou continence > 2h

Scannez
le QR code
pour découvrir
la notice



RECUEIL URINAIRE ECBU

Comment faire ?

1- Recueil


1
Lavez-vous
soigneusement
les mains



2
Effectuez
une toilette
intime (avec
une lingette
nettoyante)



3
Débouchez
le flacon* et
posez le à
l'envers sur
une surface
propre



4
Commencez
à uriner le 1er jet
dans les toilettes



Puis dans le flacon
sans dépasser
le niveau "MAX"

5
Revissez
le bouchon
à fond



**Ne jamais toucher l'intérieur
du flacon ou du bouchon*

DOCURIEC-BUKRVA6

**IDENTIFIER LE FLACON AVEC NOM, PRENOM ET DDN
COMPLÉTER LE BON AU VERSO**

**A acheminer le plus rapidement possible au laboratoire
Flacon : 2h à TA - < 24h à 2-8°C**

Si recherche de mycoplasmes : à acheminer dans les 2 h.

Renseignements administratifs et cliniques

Sexe : M F

Nom d'usage :

Nom de naissance :

Prénom (s) :

Né(e) le :/...../..... à

INS :

Tél. portable :

E-mail :

J'accepte de recevoir des informations du Laboratoire Unilabs ou de ses prestataires par e-mail et la mise en ligne de mes résultats sur la plateforme sécurisée Kiro.

Adresse :

IDENTITE CONTROLEE :

Carte d'identité Livret de famille Extrait acte de naissance Titre de séjour Passeport Non

DEMANDE DE TIERS-PAYANT

Si Maternité : DDG :/...../.....

N° S.S. :

Nom assuré(e) :

Mutuelle (N° Préf./AMC ; date de validité) :

Ordonnance renouvelable au labo du : Ordonnance à suivre

Transmission des résultats :

Internet (Formule kiro obligatoire) A poster Au laboratoire Au cabinet IDE

A faxer au :

A transmettre également au Médecin traitant :

Si vous ne souhaitez pas que vos résultats d'analyses soient transmis à un professionnel de santé autre que le médecin prescripteur, cochez la case suivante :

Date et heure de prélèvement :/...../..... à h

Flacon conservé à température ambiante (15-25°C) pendant une durée inférieure à 2h.

Flacon conservé à température réfrigérée (2-8°C), pendant une durée inférieure à 24h.

Mode de recueil : Deuxième jet (=milieu de jet)

Premier jet (=1° gouttes)

Par sondage : type de sonde utilisée : ; préleveur :

Renseignements cliniques :

Absence de symptômes urinaires

Bandelettes urinaires positives

Envie fréquente d'uriner

Douleurs en urinant

Fièvre

Douleurs lombaires

Grossesse

Bilan préopératoire

Votre médecin vous a-t-il prescrit un antibiotique ? Non

Oui (lequel :))

Antibiotique non encore débuté En cours

Terminé depuis le :