

	Recommandations de prélèvements vaginaux et vulvaires C2-INS21 Version 1.1
Instruction	Mise en application le 09/09/2024

1/PRELEVEMENT VAGINAL (auto-prélèvement vaginal, voir C2-INS23)

Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débiter un traitement antimicrobien local ou général, à la phase aiguë de la maladie.
- Le prélèvement doit être réalisé avant toute toilette intime.
- Le prélèvement doit être réalisé en dehors des périodes de règles.
- Une abstinence sexuelle de 24-48 h est recommandée.

Consommables nécessaires :

- Ecouvillon COPAN, bouchon **ROSE** (Gram, culture, PCR multiplexe).

Prélèvement :

- Installer la patiente en position gynécologique, talons dans les étriers. Mettre le spéculum en place, sans utiliser de lubrifiant, avec un éclairage adapté. La pose de spéculum n'est pas obligatoire pour un prélèvement vaginal.
- Se centrer sur le col, observer l'aspect et l'abondance des sécrétions :
SECRETIONS NULLES / PEU ABONDANTES / ABONDANTES / CAILLEBOTEES / BRUNATRES
- Si nécessaire, retirez les mucosités excédentaires de l'orifice cervical et des muqueuses environnantes à l'aide d'un écouvillon de nettoyage.
- Jetez cet écouvillon. Ecouvillonner les culs de sacs vaginaux (+/- endocol).
- Décharger vigoureusement l'écouvillon bouchon **ROSE** dans le milieu de transport
- Identifier les échantillons avec **Nom, Prénom, Date De Naissance**.
- **Noter la date, l'heure du prélèvement, l'aspect des sécrétions et les renseignements cliniques et thérapeutiques :**
 - Leucorrhée ?, Prurit ?, Métrorrhagie ?
 - Dépistage IST ?
 - Grossesse ? Avant pose d'un stérilet
 - S'agit-il d'un examen prescrit après un traitement antibiotique ?
Si Oui, Lequel ?Débuté le ?Arrêté le ?
 - S'agit-il d'un examen prescrit en cours de traitement antibiotique ?
Si Oui, Lequel ?Débuté le ?Arrêté le ?
 - Le médecin a-t' il prescrit un traitement antibiotique à commencer après le prélèvement ? Si Oui, Lequel ?Débuté le ?Arrêté le ?
- **Préciser le site anatomique prélevé : cervico-vaginal / vaginal**

2/PRELEVEMENT VULVAIRE .

Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débiter un traitement antimicrobien local ou général, à la phase aiguë de la maladie.
- Le prélèvement doit être réalisé avant toute toilette intime.

Consommable nécessaire

- Ecouvillon COPAN, bouchon **ROSE** (culture + examen direct)

Prélèvement :

- Installer la Patiente en position gynécologique, talons dans les étrières.
- Ecouvillonner la zone vulvaire. Décharger l'écouvillon bouchon **ROSE** dans le milieu de transport et rompre la tige au point de rupture.
- Identifier les échantillons avec **Nom, Prénom, Date De Naissance**
- **.Noter la date, l'heure du prélèvement et les renseignements cliniques et thérapeutiques (voir 1/)**
- **Préciser le site anatomique prélevé : vulve**

3/ Recherche d'un portage de streptocoque B Hémolytique (RBND)

Consommable nécessaire :

- Ecouvillon ELITECH TRANSWAB AMIES, bouchon **ROSE** (culture)

Prélèvement :

Examen réalisé entre 37 et 39 semaines d'aménorrhées sauf mention contraire sur ordonnance.

- Installer la patiente en position gynécologique, talons dans les étrières.
- **Sans spéculum,**
- Ecouvillonner le tiers inférieur de la cavité vaginale, en écartant manuellement les grandes lèvres vulvaires.
- Décharger l'écouvillon bouchon **ROSE** dans le milieu de transport et rompre la tige au point de rupture.
- Identifier les échantillons avec **Nom, Prénom, Date De Naissance**
- **.Noter la date, l'heure du prélèvement et les renseignements cliniques et thérapeutiques (voir 1/)**
- **Se renseigner sur une éventuelle allergie aux Béta-lactamines.**

4/ Examen d'un stérilet

Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débiter un traitement antimicrobien local ou général, à la phase aiguë de la maladie.

Consommable nécessaire :

- Flacon spécifique

Prélèvement :

- Le retrait du stérilet doit être pratiqué avec le maximum d'asepsie afin de limiter la contamination par la flore commensale vaginale.
- Couper les fils et déposer le stérilet dans le flacon
- Identifier les échantillons avec **Nom, Prénom, Date De Naissance**.
- **Noter la date, l'heure du prélèvement, l'aspect des sécrétions et les renseignements cliniques et thérapeutiques :**
 - Fièvre ? douleur ?
 - Dépistage IST ?
 - Résultat du frottis cervico-vaginal ?
 - S'agit-il d'un examen prescrit après un traitement antibiotique ?
Si Oui, Lequel ?Débuté le ?Arrêté le ?
 - S'agit-il d'un examen prescrit en cours de traitement antibiotique ?
Si Oui, Lequel ?Débuté le ?Arrêté le ?

 - Le médecin a-t' il prescrit un traitement antibiotique à commencer après le prélèvement ?
Si Oui, Lequel ?Débuté le ?Arrêté le ?

Conservation pré-analytique des échantillons :

A température ambiante :

- Flacon stérilet : < 2h

A 2-8°C :

- Ecouvillon bouchon **ROSE** < 48h