

Recueil des selles : Recherche de sang

Informations

- Chez la femme, le recueil doit être éloigné de plus de 3 jours des règles.
- En cas d'hémorroïdes ou de sang dans les urines, de faux positifs peuvent être obtenus.
- L'alcool, l'aspirine ou d'autres médicaments irritants pour l'appareil gastro-intestinal peuvent provoquer des saignements. Leur prise doit être arrêtée au moins 48 heures avant le recueil des selles.
- Aucun régime alimentaire préalable au recueil n'est nécessaire.

Recueil

- Recueillir un échantillon de selles fraîchement émises directement dans le flacon.
- Répéter l'opération les deux jours suivants (en cas de prescription sur 3 jours).

Apporter le flacon dans la journée au laboratoire.
Si recueil sur 3 jours, apporter les flacons au fur et à mesure

Conservation 6h entre 18 et 25°C ou 3 jours entre 2 et 8°C

Bien noter votre nom, prénom et date de naissance sur le(s) flacon(s).

DE-MU3-013-04

Recueil des selles : Recherche de sang

Informations

- Chez la femme, le recueil doit être éloigné de plus de 3 jours des règles.
- En cas d'hémorroïdes ou de sang dans les urines, de faux positifs peuvent être obtenus.
- L'alcool, l'aspirine ou d'autres médicaments irritants pour l'appareil gastro-intestinal peuvent provoquer des saignements. Leur prise doit être arrêtée au moins 48 heures avant le recueil des selles.
- Aucun régime alimentaire préalable au recueil n'est nécessaire.

Recueil

- Recueillir un échantillon de selles fraîchement émises directement dans le flacon.
- Répéter l'opération les deux jours suivants (en cas de prescription sur 3 jours).

Apporter le flacon dans la journée au laboratoire.
Si recueil sur 3 jours, apporter les flacons au fur et à mesure

Conservation 6h entre 18 et 25°C ou 3 jours entre 2 et 8°C

Bien noter votre nom, prénom et date de naissance sur le(s) flacon(s).

DE-MU3-013-04

Recueil des selles : Recherche de sang

Informations

- Chez la femme, le recueil doit être éloigné de plus de 3 jours des règles.
- En cas d'hémorroïdes ou de sang dans les urines, de faux positifs peuvent être obtenus.
- L'alcool, l'aspirine ou d'autres médicaments irritants pour l'appareil gastro-intestinal peuvent provoquer des saignements. Leur prise doit être arrêtée au moins 48 heures avant le recueil des selles.
- Aucun régime alimentaire préalable au recueil n'est nécessaire.

Recueil

- Recueillir un échantillon de selles fraîchement émises directement dans le flacon.
- Répéter l'opération les deux jours suivants (en cas de prescription sur 3 jours).

Apporter le flacon dans la journée au laboratoire.
Si recueil sur 3 jours, apporter les flacons au fur et à mesure

Conservation 6h entre 18 et 25°C ou 3 jours entre 2 et 8°C

Bien noter votre nom, prénom et date de naissance sur le(s) flacon(s).

DE-MU3-013-04

Recueil des selles : Recherche de sang

Informations

- Chez la femme, le recueil doit être éloigné de plus de 3 jours des règles.
- En cas d'hémorroïdes ou de sang dans les urines, de faux positifs peuvent être obtenus.
- L'alcool, l'aspirine ou d'autres médicaments irritants pour l'appareil gastro-intestinal peuvent provoquer des saignements. Leur prise doit être arrêtée au moins 48 heures avant le recueil des selles.
- Aucun régime alimentaire préalable au recueil n'est nécessaire.

Recueil

- Recueillir un échantillon de selles fraîchement émises directement dans le flacon.
- Répéter l'opération les deux jours suivants (en cas de prescription sur 3 jours).

Apporter le flacon dans la journée au laboratoire.
Si recueil sur 3 jours, apporter les flacons au fur et à mesure

Conservation 6h entre 18 et 25°C ou 3 jours entre 2 et 8°C

Bien noter votre nom, prénom et date de naissance sur le(s) flacon(s).

DE-MU3-013-04