

Recueil d'un échantillon urinaire pour CYTOLOGIE URINAIRE

1. Recommandations

- Se fournir au laboratoire ou dans une pharmacie ou auprès d'un professionnel médical d'un flacon stérile adapté pour le recueil d'échantillon d'urines.
- Recueillir une miction complète dans ce flacon en évitant la première miction du matin et après une marche ou un décubitus actif de 30 minutes.
- Le recueil est réalisé par le patient lui-même idéalement au laboratoire. Il peut être également effectué à domicile par les patients eux-mêmes ou par un professionnel de santé mais en respectant les conditions de recueil, les conditions de conservation et les délais d'acheminement au laboratoire.

Comme tout prélèvement, les **renseignements cliniques** sont vivement recommandés.

2. Matériel utilisé

- Lingette imbibée de solution antiseptique sous emballage unique (pour les prélèvements réalisés au laboratoire).
- Collecteur d'urine sous emballage unique remis au laboratoire (pour les enfants de bas ages).
- Flacon stérile.

Indiquer le mode de prélèvement sur la fiche de suivi (sondage urinaire, collecteur stérile, collecteur non stérile, prélèvement dans la sonde).

3. Température et délai de conservation :

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais (inférieur à 8h à température ambiante).