




A faire avant mise en route du traitement antibiotique.

Prélever sur écouvillon avec milieu de transport

(type Amies)



Renseigner le site de l'écouvillonnage, la prise éventuelle d'ATB, les signes cliniques

Oeil :

Recueil sur écouvillon des sécrétions par frottis conjonctival et recueil du pus dans l'angle interne de l'oeil

Si recherche de Chlamydiae, milieu de transport spécifique

Gorge :

L'émission du son A par le patient a pour but de diminuer le réflexe nauséeux. Il peut être utile d'abaisser la langue pour dégager le pharynx et éviter tout contact salivaire.

Écouvillonnage des amygdales ou en leur absence des piliers du voile du palais.

En cas d'ulcération ou exsudat, prélever à ce niveau

Pour la recherche buccale de Candida, prélèvement au niveau de la langue, du palais et de la face interne des joues.

Nasal :

Écouvillonnage du tiers inférieur des deux narines Si Recherche de coqueluche : Protocole et milieu de transport spécifique disponible au laboratoire

Lésions et suppurations cutanées :

Prendre les précautions d'asepsie pour éviter de contaminer le prélèvement par les bactéries se trouvant normalement sur la



peau (désinfecter le pourtour de la lésion à l'alcool, une déterision au sérum physiologique stérile de la zone à prélever est recommandée).

Passer les écouvillons sur toute leur surface au niveau de la zone à prélever. En cas de suppuration, recueil sur écouvillon par pression sur la plaie (percer au préalable dans le cas d'un furoncle par exemple)

Prélèvements génitaux :

Le prélèvement urétral doit être fait au moins 2 heures après la dernière miction. Recueillir si possible une goutte de pus, puis introduire et faire tourner l'écouvillon fin dans l'urètre.

Prélèvement vaginal : Prélever au niveau du cul de sac vaginal postérieur (recherche vaginose ou vaginite, mycose et mycoplasmes), au niveau endocol (sauf femme enceinte) (recherche de Neisseria gonorrhoeae, Chlamydiae trachomatis)

Pour la recherche de Chlamydiae, Mycoplasmes, Herpes virus : prendre un écouvillon spécifique, milieux de transports spécifiques

Dépôt : de préférence avant midi