LISTE DES EXAMENS A PRELEVER AU LABORATOIRE

Cette liste est non exhaustive

Les examens demandés par une assurance et par une préfecture sont **impérativement** prélevés au laboratoire **avec vérification d'une pièce d'identité**. Les prélèvements réalisés à l'extérieur seront refusés pour des raisons de facturation et de traçabilité.

Examens	Conditions particulières après le prélèvement
Acide oxalique sérique	Congélation dans l'heure
Acide pyruvique	Protocole spécifique de prélèvement et de conservation
ACTH	Tube spécial (plasma EDTA + aprotinine) / Centrifugation et congélation < 4H Domicile accepté si transmis dans les 2H suivant le prélèvement
ADH	Centrifugation et congélation dans l'heure
Agglutinines froides	Prélèvement dans matériel à +37°C - exclusivement sur les sites Vauban et Valognes
Ammoniémie	Prélèvement sur glace –au laboratoire du CHPC exclusivement. Le patient doit de prendre RDV avec le CHPC.
Angiotensine II	Recueillir le prélèvement sur des tubes préalablement refroidis. Centrifuger à température "réfrigérée". Congélation dans l'heure
Anticoagulant circulant	Double centrifugation et Congélation dans les 4H, à transmettre au plateau technique dans les 3H suivant le prélèvement. Domicile accepté si les contraintes pré-analytiques suivantes sont respectées : ⇨ Transmission dans les 2H suivant le prélèvement au site pré-ana ⇨ Transmission dans les 3H au plateau ⇨ Echantillon étiqueté « URGENT »
Antithrombine III (AT3)	
Calcitonine	Congélation dans les 2 heures
Calcium ionisé	Congélation dans l'heure
Caryotype	Sur RDV du lundi au jeudi + Pièce d'identité
Catécholamines plasmatiques	Congélation dans l'heure
CH50	Congélation dans l'heure
Cryoglobulines	Prélèvement dans matériel à +37°C - exclusivement sur les sites Vauban et Valognes
Cystinurie	Congélation dans l'heure
Drogues urinaires	Protocole particulier : sous surveillance + Pièce d'identité
ECP	Protocole spécifique de prélèvement et de conservation
Gastrine	Centrifuger rapidement entre 2°C et 8°C et congeler dans les 4 heures
HELIKIT / INFAI	Protocole particulier
Homocystéine	Centrifugation dans l'heure

Examens	Conditions particulières après le prélèvement
Isoniazide (INH)	Congélation dans l'heure
Neuron Spécific Enolase (NSE)	Centrifugation et congélation dans l'heure
Oxyde de carbone (CO)	Prélèvement à réfrigérer
Protéine C	Double centrifugation et Congélation dans les 4H, à transmettre au plateau technique dans les 3H suivant le prélèvement. Domicile accepté si les contraintes pré-analytiques suivantes sont respectées : ⇨ Transmission dans les 2H suivant le prélèvement au site pré-ana ⇨ Transmission dans les 3H au plateau ⇨ Echantillon étiqueté « URGENT »
Protéine S	
Quantiféron	Echantillon à conserver entre 2 et 8°C
Recherche de dermatophytes	Acte de biologiste
Recherche de sarcoptes	Acte de biologiste
Rénine	Congélation immédiate
Résistance à la protéine C activée	Double centrifugation et Congélation dans les 4H, à transmettre au plateau technique dans les 3H suivant le prélèvement. Domicile accepté si les contraintes pré-analytiques suivantes sont respectées : ⇨ Transmission dans les 2H suivant le prélèvement au site pré-ana ⇨ Transmission dans les 3H au plateau ⇨ Echantillon étiqueté « URGENT »
Test de Kleihauer	Envoi urgent au laboratoire du CHPC
Uracilémie (Phénotypage DPD)	Double centrifugation dans l'heure
Vitamine A	A conserver à l'abri de la lumière et Congélation dans les 4H Domicile accepté si contrainte pré-analytique respectée A jeun
Vitamine B1	Congélation dans les 30 minutes A jeun
Vitamine C (ou Acide ascorbique)	Centrifugation dans les 30 minutes puis décantation et congélation immédiate Prélèvement exclusivement sur les sites Vauban et Valognes