PRELEVEMENT POUR DOSAGE DE L'ETHYLEMIE

A. Au préalable

- Avant toute manipulation du patient, se laver les mains avec du savon (pas de gel hydroalcoolique)
- Installer le patient confortablement
- S'assurer de la bonne identité du patient en lui demandant (**question ouverte**) son nom, prénom, sa date de naissance et comparer avec l'ordonnance et la planche d'étiquettes
- Relire l'ordonnance et vérifier la planche d'étiquettes (nom du prescripteur, code analyse enregistré, …)
- Sur la planche d'étiquettes préciser avec quel produit la désinfection a été faite et viser la planche qui sera ensuite scannée
- Etiqueter l'ordonnance.

B. Prélèvement

Matériel nécessaire

- garrot,
- système Vacutainer (corps de pompe, aiguille)
- dakin comme désinfectant

  Remarque : Ne pas utiliser d'alcool qui pourrait fausser les résultats.
- coton, sparadrap,
- 1 tube fluorure, **dédié**
- gants.

Mode opératoire

Se référer au mode opératoire « Prélèvement sanguin » (PR-O1PRVMTMO001) pour l'acte de prélèvement.

Remarques : Le prélèvement à la seringue est à proscrire car le tube ne doit pas être débouché avant d'être analysé.

Prélever un tube fluorure **en plus dédié** pour le dosage de l'éthylémie, **en cas de prescription associée de glycémie.**

Après le prélèvement

- Coller le code à barres spécifique « ALCOOL » sur le tube dédié
- Prévenir la technique pour que le test soit calibré
- Ne pas ouvrir le tube
- Remettre l'échantillon en main propre au technicien au poste.