PROTOCOLE
PRELEVEMENT NASOPHARYNGE PCR Covid 19

1) Insérer l'écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais (*cf.* schéma)

2) Ecouvillonner l'épithélium des fosses nasales en réalisant des mouvements rotatifs **pendant 10 secondes** en grattant les parois du nasopharynx afin de recueillir des cellules

3) Le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif

4) Placer l'écouvillon dans le tube et reboucher le tube

5) **Identifier OBLIGATOIREMENT** le tube avec une étiquette ou de façon manuscrite (nom, prénom et date de naissance)

6) Placer le tube dans un sachet plastifié

Unilabs | Cedibio
1 / 1

PROTOCOLE
PRELEVEMENT NASOPHARYNGE PCR Covid 19

1) Insérer l'écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais (*cf.* schéma)

2) Ecouvillonner l'épithélium des fosses nasales en réalisant des mouvements rotatifs **pendant 10 secondes** en grattant les parois du nasopharynx afin de recueillir des cellules

3) Le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif

4) Placer l'écouvillon dans le tube et reboucher le tube

5) **Identifier OBLIGATOIREMENT** le tube avec une étiquette ou de façon manuscrite (nom, prénom et date de naissance)

6) Placer le tube dans un sachet plastifié

MT-A5-036-02