



NOM : **PRÉNOM :**
À remplir et à remettre au laboratoire avec les 2 lames de scotch-test

Intérêt de l'examen	<p><i>Ce test permet de mettre en évidence les œufs d'Oxyures (vers intestinaux) très fréquents chez les enfants et très contagieux, entraînant des démangeaisons anales et péri-anales particulièrement la nuit et pouvant causer des troubles du sommeil.</i></p> <p><i>Chez les petites filles, une vulvite peut aussi être présente.</i></p>
Matériel	<p>Le matériel nécessaire :</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>2 lames et un étui porte-lame : fourni par le laboratoire</i>• <i>un ruban adhésif TRANSPARENT (non opaque)</i>
Réalisation du prélèvement	<ul style="list-style-type: none">• Conditions de réalisation :<ul style="list-style-type: none">□ À effectuer au lever AVANT la toilette intime□ ET avant l'émission des 1ères selles• Réalisation du prélèvement<ul style="list-style-type: none">✓ Appliquer le côté adhésif du scotch sur les plis de la marge anale et le maintenir en appuyant quelques secondes.✓ Retirer le scotch et l'étaler sur la lame✓ Renouveler l'opération avec la seconde lame✓ Replacer les 2 lames dans l'étui.✓ Identifier l'étui avec votre nom, prénom et la date du prélèvement• Acheminement au laboratoire : <i>dès que possible avec conservation à T° ambiante</i>

ZONE RESERVÉE AU LABORATOIRE

Étiquette DOSSIER	Matériel reçu	Opérateur :
	<input type="checkbox"/> 2 lames <input type="checkbox"/> 1 lame	

Conformité échantillon : OUI **NON**

→ **MOTIF(s) :**

- scotch opaque
- conditions de recueil non respectées ou non précisées
- lame(s) sans scotch ou non ramenées au laboratoire

- scotch plissé sur la lame
- défaut d'identification de l'étui

→ **MESURE prise par le laboratoire :**

DÉROGATION : envoi au PT

REJET du prélèvement