



Fiche de renseignements : Prélèvements cutanés à la recherche de Sarcoptes (gale)

A remplir par le préleveur

MU-ADP-DEN46

Version 01

Applicable le : 12/02/20

N° Dossier (codeBarreDemande)

Identité Patient :

Né(e) le :
(ou étiquette)

Préleveur :

Date de réalisation :

Heure de réalisation :

() au labo () en cabinet () en EDS

- Histoire de la maladie – Cycle du parasite :

Ponte d'1 à 2 œufs par jour par l'adulte femelle

Durée de vie 1 mois sur le corps mais 24-48H dans l'environnement

Cycle de croissance : 10 à 15J de l'œuf à l'adulte (passage par un stage larvaire)

- Indication de l'analyse

- () suspicion de gale commune
- () suspicion de gale profuse (sujets âgés et/ou immunodéprimés)
- () suspicion de gale du nourrisson
- () suspicion de ré-infestation ou d'échec du traitement : persistance des symptômes plus de 15j après un traitement efficace

Localisations des lésions et période d'incubation selon l'entité clinique :

Entité clinique	Localisation préférentielle	Incubation	Quantité de parasites
Gale commune	Espaces interdigitaux palmaires, poignet, coude, aisselles ; puis mamelons puis grands plis, fourreau de la verge	Environ 3 semaines (1 à 6 semaines)	A peine quelques dizaines d'adulte sur le corps
Gale du nourrisson	Dos, plantes des pieds, aisselles, ombilic, fesses ; puis bras, poitrine et cuisse		
Gale profuse	Tout le corps (+/- sauf le visage)		
Ré-infestation	IDEM ci-dessus selon l'entité clinique	3 jours	Très grande quantité de parasites sur tout le corps

- Réalisation du prélèvement :

Prélever 3 zones différentes à choisir selon les localisations préférentielles décrites ci-dessus

- raclage des sillons non grattés ou des vésicules perlées non percées ou le chancre scabieux **et/ou**
- récupération des produits de grattage sous les ongles

=> décharger le matériel récupéré sur une lame et fixer-le à l'aide **d'un scotch transparent**.

Zone prélevée N°1 : () Main () Poignet () Coude () Bras () Poitrine () Aisselles () Abdomen () Dos () Aine () Cuisse () Verge () Pied

Zone prélevée N°2 : () Main () Poignet () Coude () Bras () Poitrine () Aisselles () Abdomen () Dos () Aine () Cuisse () Verge () Pied

Zone prélevée N°3 : () Main () Poignet () Coude () Bras () Poitrine () Aisselles () Abdomen () Dos () Aine () Cuisse () Verge () Pied

- Récupération des produits de grattage sous les ongles : () OUI () NON

- Conformité :** () application de crèmes avant le plvmt
- () absence de lésion visible au moment du plvmt
 - () lames défectueuses
 - () quantité de squames recueillis faible