



PRECONISATIONS POUR UN PRELEVEMENT VAGINAL (ou vulvaire)

Précautions préalables :



Conseiller aux patientes de **s'abstenir 3 JOURS** avant le prélèvement :

- de toutes relations sexuelles,
- de faire un lavage vaginal (« douche vaginale »),
- d'utiliser des tampons,
- d'utiliser des médicaments intra-vaginaux, crèmes/gels locaux.

Eviter également les périodes de forts saignements menstruels.

Les prélèvements sont à effectuer **avant examen pelvien**.
Si possible éviter l'usage de lubrifiants et préférer l'eau tiède ou au maximum **éviter le contact de l'écouvillon avec le lubrifiant et le spéculum.**



Pour les prélèvements avec recherche Herpès (HSV) Veuillez adresser votre patient directement au laboratoire ACM Bio.

PRECONISATIONS POUR TOUS LES PRELEVEMENTS



Le prélèvement doit être réalisé **avant ou à distance de tout traitement antibiotique :**

- au moins 5 jours après l'arrêt du traitement pour les germes banaux,
- au moins 6 semaines après l'arrêt du traitement pour Chlamydiae et Mycoplasma genitalium.

Après le prélèvement, **casser l'écouvillon dans le milieu de transport. Revisser le bouchon.**
Placer les **tubes identifiés** dans un sachet scellé.

