







Préconisations patiente auto-prélèvement vaginal

Protocole de prélèvement

Le prélèvement s'effectue sur <u>1 seul écouvillon</u> (bouchon rose) disponible au laboratoire.

Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débuter un traitement antimicrobien local ou général, à la phase aiguë de la maladie.
- Le prélèvement doit être réalisé avant toute toilette intime.
- Le prélèvement doit être réalisé en dehors des périodes de règles.
- Une abstinence sexuelle de 24 48 h est recommandée.
- 1- Se laver les mains.
- 2- Lors de l'ouverture du kit de prélèvement, ne pas toucher l'embout de l'écouvillon, ne pas poser l'écouvillon sur une quelconque surface.
- 3- Prélèvement :

Ecarter manuellement les grandes lèvres vulvaires et insérer l'écouvillon dans le vagin (environ 5-10 cm) et le faire tourner doucement 5 à 10 fois. S'assurer que l'écouvillon touche les parois du vagin.

- 4- Retirer l'écouvillon sans toucher la peau.
- 5- Placer l'écouvillon dans le tube et rompre la tige au point rupture. Laisser l'écouvillon restant dans le tube.
- 6- Identifier le tube avec votre nom, prénom et date de naissance.
- 7- Mettre le tube dans le sachet, sceller le sachet, mettre cette fiche complétée dans la pochette kangourou avec la prescription.
 Apportez votre prélèvement au laboratoire le plus rapidement possible (conservation à température ambiante inférieure à 24H).

	renoughomento dammordano				
•	• Nom :	▶ Prénom :	. ► Sexe : □ M	□F	
>	Nom de Naissance	► Date De Naissance :/	. /		

Ransaignaments administratife

>	N° de Tél : / /			
▶	Adresse:			
>	Transmission des résultats au patient :			
	☐ Mail → Adresse mail :			
	□ Laboratoire □ Pharmacie, laquelle :□ Domicile			
▶	► N° Sécurité Sociale :			
	Caisse : Centre :			

► Nom de la Mutuelle : N° AMC / télétrans :

Renseignements cliniques et thérapeutiques

▶	Date du prélèvement : / ► Heure de prélèvement : H Cocher :
▶	ervation de l'échantillon ?
	☐ Ecouvillon conservé à température ambiante (15-25°C), pendant une durée inférieure à 24h.
•	Respect des préconisations par la patiente : Prélèvement avant toilette intime : □ OUI □ NON Abstinence sexuelle de 48h : □ OUI □ NON
▶	Origine du prélèvement : ☐ Vagin + col. ☐ Vagin. ☐ Vulve.
•	La patiente présente-t-elle les signes suivants ? □ Pertes vaginales (leucorrhée). Préciser : □ Sécrétions nulles. □ Sécrétions peu abondantes. □ Sécrétions abondantes. □ Sécrétions brunes (sang). □ Sécrétions caillebottée (grumeaux). □ Démangeaison (prurit).
	□ Grossesse. La patiente est-elle allergique à un antibiotique de type Blactamines ? □ OUI □ NON □ Dépistage Infection Sexuellement Transmissible (IST). □ Saignements entre les règles (métrorrhagie). □ Avant pose stérilet. □ Autre :
•	Traitement: Traitement prévu: □ NON □ OUI, Lequel: