ETIQUETAGE FLACON HEMOCULTURE



Ne pas masquer le code à barre

Température et délai de conservation :

- Les flacons doivent être acheminés au laboratoire dans les plus brefs délais.
- Transport à température ambiante : pas de mise à l'étuve

BIOLIB - GALLIENI	BIOLIB - RIALTO	BIOLIB - COUTRAS
11 Avenue Galliéni 33500 Libourne 05.57.55.38.48 laboratoire.gallieni@unilabs.com	9 Allée Robert Boulin 33500 Libourne 05.57.51.10.89 laboratoire.rialto@unilabs.com	6 Rue François Mitterrand 33230 Coutras 05.57.48.40.60 laboratoire.coutras@unilabs.com
BIOLIB - MONTPON	**BIOLIB - VAYRES**	**BIOLIB – ST LOUBES**
82 Avenue Georges Pompidou 24700 Montpon Menesterol 05.53.80.07.35 laboratoire.montpon@unilabs.com	14 Avenue de Libourne 33870 Vayres 05.57.84.92.92 laboratoire.vayres@unilabs.com	3 Chemin du Livey 33450 Saint Loubès 05.56.78.93.68 laboratoire.stloubes@unilabs.com

Unilabs | Biolib

HEMOCULTURES : FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET PRECONISATIONS DE PRELEVEMENT

ENR-PRE-018-03
Version : 3
Applicable le : 18-09-2023

Ce formulaire est à retourner impérativement au laboratoire accompagné du prélèvement
Ne pas oublier de joindre l'ordonnance

Noter sur l'étiquette : nom, prénom et date de naissance du patient.
Rapporter le prélèvement dans les plus brefs délais
Nom Usuel : ……
Nom de naissance :…… Prénom :……
Date de naissance : …../……../…….. Sexe : F M
Lieu de naissance : ……
Adresse……
Code postal…… .Ville……
N° de Tél : ……
Date du prélèvement : …../……../…… Heure : ……
Préleveur : ……

Pour bénéficier du Tiers-Payant
N°SS :……
……
Organisme SS: ……
Mutuelle :……
……
(ou photocopie carte)

Traitement antibiotique/ antifongique/ antiviral :
□ NON
□ OUI : Précisez :

Renseignements cliniques
□Grossesse □ Neutropénie □ Immuno-dépression □ CRP : .....mg/L
□Température :.....° □MAP,RPM □Absence de symptômes
□ Diabète □ Mucoviscidose □Autre :

Hémocultures
1 paire =flacon aérobie et flacon anaérobie
(volume requis par flacon: *8 à 10 mL*)

Numéro : …… □ périphérique
□matériel ……
Numéro : …… □ périphérique
□matériel ……

Coller étiquette du flacon : paire n°:…
Coller étiquette du flacon : paire n°:…
Coller étiquette du flacon : paire n°:…
Coller étiquette du flacon : paire n°:…

Modalité de prélèvement :
COLLER ETIQUETTES DES FLACONS
□ Prélèvement unique (2 à 3 paires prélevées en une seule fois sur 24 h)
□ Prélèvement multiple (2 à 3 paires prélevées en 2 à 3 fois sur 24 h)

Condition particulière imposant le prélèvement multiple :
□ Endocardite et/ou Pace-Maker, sonde/valve cardiaque
□ Infection sur matériel (1 paire en périphérie et 1 paire prélevée sur matériel à < 15 minutes d'intervalle)

INTERNET: ☐ oui **LABORATOIRE**: ☐ oui **POSTER** : ☐ oui
Mail obligatoire :……Signature……

☐ En cochant cette case, J'accepte de recevoir des informations du Laboratoire Unilabs ou de ses partenaires mandatés (*) par e-mail, et la mise en ligne de mes résultats sur la plateforme sécurisée Kiro. Je reconnais que mon adresse e-mail est personnelle, sécurisée et accessible uniquement aux personnes autorisées.

Technique de prélèvement

Attention ! Prélever l'hémoculture avant les autres prélèvements sanguins

1) HYGIÈNE des mains : friction hydroalcoolique

2) Patient informé, installé confortablement, **identité vérifiée**

3) Choix du protocole de prélèvement et voie à utiliser + numérotation des paires de flacons sur les flacons 1 paire = 1 flacon aérobie (vert) + 1 flacon anaérobie (orange) (≈ 10 mL /flacon)

PRELEVEMENT UNIQUE pour les cas généraux

2-3 Paires en une seule fois sur voie veineuse périphérique (VVP)

PRELEVEMENT MULTIPLE si suspicion d'endocardite



3 paires en 3 fois sur 24h à au moins 1h d'intervalle

PRELEVEMENT MULTIPLE si suspicion d'infection sur matériel



1 paire sur le matériel suspecté et d'1 paire sur VVP avec le minimum d'intervalle possible entre les 2 prélèvements (< 15 min)

o **vérifier date de péremption des flacons + milieu limpide + fond du flacon ≠ jaune**
o **ôter les protections** des bouchons
o **désinfecter** les bouchons avec les compresses imbibées d' alcool puis les jeter
o **laisser sécher à l'air libre au moins 30 secondes (ne surtout pas laisser les compresses sur les bouchons)**

Unilabs | Biolib
HEMOCULTURES : FICHE DE RENSEIGNEMENTS ET PRECONISATIONS DE PRELEVEMENT
ENR-PRE-018-03
Version : 3
Applicable le : 18-09-2023

4) ASSEMBLER l'aiguille à ailettes au corps de prélèvement spécial Hémoculture
N.B. : les prélèvements sanguins sont effectués en suivant du retrait du dernier flacon d'hémoculture.

5) POSER LE GARROT environ 10 cm au-dessus du site de ponction
6) REPÉRER le point de ponction puis relâcher le garrot

7) PRÉPARATION CUTANÉE DU SITE DE PONCTION EN 4 TEMPS (betadine rouge –rincage à l'eau ou sérum physiologique stériles – séchage avec compresse stérile – bétadine orange sauf si allergie

8) HYGIÈNE des mains : friction hydroalcoolique

9) RESERRER LE GARROT (durée < 5 min.)

10) ENFILER des GANTS

11) PONCTIONNER la veine sans retoucher le site de ponction (observer le retour de sang dans la tubulure)

12) ENGAGER le flacon dans le corps de pompe en le tenant plus bas que le bras du patient et en position verticale afin de **VÉRIFIER** le volume de sang **≈ 10 mL sang/flacon**
en 1er : flacon aérobie puis anaérobie ainsi de suite le cas échéant.



Remplir **chaque flacon jusqu'au repère = trait blanc sur bande noire**
10 ml par flacon
(pas plus, pas moins!)

13) RETIRER le garrot ; **DÉPIQUER** le patient ;
Éliminer l'unité de prélèvement dans le collecteur d'objets piquants / tranchants

14) COMPRIMER le point de ponction avec une compresse sèche ; poser un pansement

15) AGITER doucement les flacons

16) RETIRER et éliminer les gants + **HYGIÈNE des mains : friction hydroalcoolique**

17) ÉTIQUETER les flacons sans masquer leur code-barre et le numéro attribué précédemment