

**Objectif :**

Prélèvement d'un échantillon sanguin veineux en vue de la réalisation d'un dosage de médicament.

**Préconisations pour le prélèvement**

Préciser le Traitement du patient : posologie, date et heure de la prise

Les conditions, heures sont dans le tableau ci- dessous

Famille	Médicament	Administration	C° dosée	Conditions de prélèvement
ANTICOAGULANT	Héparine standard « Calciparine »	IVSE  SC (2 à 3 / jour) <b>Cas général :</b>	moyenne	sans importance (au moins 6h après début du traitement et 4 à 6 h après modification de dose)
	<b>Héparine Bas Poids Moléculaire</b> « Lovenox, Fragmine, Fraxiparine»  « Innohep, Fraxodi »	SC		exactement entre 2 injections  3 à 4h après l'injection  4 à 6h après l'injection
	<b>AVK</b> Acenocoumarol « Sintrom » Warfarine « Coumadine » Fluindione « Préviscan »			sans importance (à partir du 4 <sup>e</sup> jour après début du traitement, puis 3 à 6 jours après le premier contrôle ou 3 jours après une modification de dose)
	ANTIEPILEPTIQUE	Ac Valproïque « Dépakine »		résiduelle 1 semaine après début traitement le matin, avant la 1ère prise
	Carbamazépine « Tégrétol »		résiduelle 2 semaines après début traitement le matin, avant la 1ère prise	
	Phénytoïne « Dihydan »		résiduelle 2 semaines après début traitement le matin, avant la 1ère prise	
	Phénobarbital		résiduelle 2 semaines après début traitement le matin, avant la 1ère prise	
LITHIUM	« Théralithe » Forme standard  Forme LP		résiduelle résiduelle moyenne	le matin, avant la 1ère prise 24h après la prise, avant toute nouvelle prise (soir) 12h après la prise (matin)
ANTIASTHMATIQUE	Théophylline		résiduelle	48h après début traitement le matin, avant la 1ère prise
ANTIBIOTIQUE		IM/IV (1/jour)		48 après début traitement
-Aminosides	Amikacine Gentamicine Tobramycine « Nebcine »	<b>Cas général :</b>  Cas particulier :	<b>résiduelle</b>  Au pic	<b>avant l'injection suivante (IM/IV)</b>  60 min après injection IM 30 min après fin perfusion IV (bras opposé à la perfusion)
-glycopeptides	Vancomycine		résiduelle	avant injection suivante
CARDIOACTIF	Digoxine « Digoxine »		résiduelle	1 semaine après début traitement le matin, avant la 1ère prise
IMMUNOSUPPRESSEUR				5 jours après début de traitement
	Ciclosporine « Neoral, Sandimmun »		Au pic résiduelle	2 h +/- 10 min après la prise le matin, avant la prise
	Sirolimus		résiduelle	le matin, avant la prise
	Tacrolimus		résiduelle	le matin, avant la prise