



## 1. Recommandations

- Les prélèvements sont réalisés par les patients eux-mêmes idéalement au laboratoire. Ils peuvent être également effectués à domicile par les patients eux-mêmes ou par un professionnel de santé mais en respectant les conditions de recueil, les conditions de conservation et les délais d'acheminement au laboratoire.
- Les recueils sont réalisés si possible avant le début d'un traitement ou à distance de tout traitement.

Comme tout prélèvement, les **renseignements cliniques** sont vivement recommandés. Il faut compléter et renseigner la fiche de suivi médicale accompagnant les prélèvements:

- Date et heure de recueil
- Mode de prélèvement (milieu du jet, collecteur stérile, collecteur non stérile, sonde à demeure, sondage urinaire, ...),
- renseignements cliniques
  - Présence de symptômes urinaires : brûlures mictionnelles, pollakiurie, mictions impérieuses, pesanteur sus-pelvienne, douleurs lombaires, émission d'urines troubles ou hématuriques
  - Fièvre.
  - Terrain particulier : immunodépression, diabète, insuffisance rénale, grossesse.
  - Antibiothérapie en cours.
  - Contrôle après traitement.

## 2. Matériel utilisé :

- Flacon stérile.
- Ces flacons peuvent être récupérés soit directement auprès du laboratoire soit dans les pharmacies et/ou auprès des professionnels médicaux de la région (médecins, infirmières).

## 3. Prélèvement :

- Recueillir les premières urines du matin après un effort (marche, sautilllements) en forçant en fin de miction afin de détacher les œufs de la muqueuse vésicale.
- Identifier le flacon avec votre nom, prénom, date de naissance si cela n'a pas été fait par le laboratoire). Noter date et heure du recueil.

## 4. Température et délais de conservation :

Le flacon doit être acheminé au laboratoire dans les plus brefs délais. Délai maximum : 12h à température ambiante.