

Objectif :

Prélèvement génital en vue d'examen bactériologique.

Préconisations pour le prélèvement

Eviter tout traitement antibiotique et/ou antifongique 48 heures avant le prélèvement (sauf urgence de diagnostic).

Préciser un traitement antibiotique en cours ou récent.

- Vaginal : Hors menstruation
- Urétral ou 1^{er} jet urinaire : Demander au patient de ne pas uriner durant les **2 heures** qui précèdent le prélèvement.

Matériel :

- Gants
- Lingette antiseptique
- Ecouvillon avec milieu de transport (urétral / standard)
- Kit de prélèvement chlamydia trachomatis
- HPV, HSV : Kit de prélèvement virus
- le cas échéant, speculum pour prélèvement vaginal

Prélèvements :

Identifier tous les prélèvements avec le nom et prénom et noter la date et l'heure du prélèvement.

Si redondance d'examens, voir doc « adaptation de prescription »

HOMME

	Analyse à effectuer	Examen de première intention	Autres niveaux selon prescription	Matériel	Remarque
HOMME	BACTERIOLOGIE	Urètre Gland Anal		Ecouvillon avec milieu de transport (à casser dans milieu de transport) 	
	CHLAMYDIA	1 ^{er} jet urines	Urètre Anal Gorge	Kit chlamydia : Ecouvillon (à casser dans milieu de transport) Kit chlamydia : transvaser urines dans le tube (niveau de remplissage entre les 2 traits) 	Recherche de Chlamydia SYSTEMATIQUE lors d'un prélèvement génital homme Si recherche concomittante de Chlamydia et Mycoplasma genitalium un seul tube suffit
	MYCOPLASMES (Culture)	1 ^{er} jet urines	Urètre	Ecouvillon avec milieu de transport (à casser dans milieu de transport) Transvaser 1 ^{er} jet dans tube sans conservateur 	- Recherche de mycoplasme sur demande explicite
	MYCOPLASMA GENITALIUM (par PCR)	1 ^{er} jet urines	Urètre	Kit avec écouvillon : Ecouvillon (à casser dans milieu de transport) Kit avec pipette : transvaser urines dans le tube (niveau de remplissage entre les 2 traits) 	Recherche de <i>M. genitalium</i> sur demande explicite ou si indiqué "Recherche de Mycoplasme par PCR Si recherche concomittante de Chlamydia et Mycoplasma genitalium un seul tube suffit

FEMME

Installer la patiente en position gynécologique sur la table d'examen.

Enfiler les gants.

Mettre en place le spéculum avec précaution et mettre en évidence le col utérin.

	Analyse à effectuer	Examen de première intention	Autres niveaux selon prescription	Matériel	Remarque	
FEMME	BACTERIOLOGIE MYCOPLASMES (culture)	Vaginal (+/- endocol)	Vulve Urètre Anal 1 ^{er} jet urines	Ecouvillon avec milieu de transport (à casser dans milieu de transport) Transvaser 1 ^{er} jet dans tube sans conservateur	 	<i>Ne pas utiliser de speculum si</i> - Grossesse >6 mois - Enfant <i>Prélèvement acceptable :</i> - Prélèvement vaginal sans pose de spéculum - Auto prélèvement par patiente
	MYCOPLASMA GENITALIUM (par PCR)	Vaginal (+/- endocol)	1 ^{er} jet urines	Kit avec écouvillon : à casser sans milieu de transport Kit avec pipette : transvaser urines dans le tube (niveau de remplissage entre les 2 traits)	 	Recherche de <i>M. genitalium</i> sur demande explicite ou si indiqué "Recherche de Mycoplasme par PCR" Si recherche concomittante de Chlamydia et Mycoplasma genitalium un seul tube suffit
	CHLAMYDIA	Vaginal (+/- endocol)	Urètre 1 ^{er} jet urines Anal Gorge	Kit chlamydia : Ecouvillon (à casser dans milieu de transport) Kit chlamydia : transvaser urines dans le tube (niveau de remplissage entre les 2 traits)	 	Si demande explicite ou à l' initiative du biologiste (NABM) <i>Prélèvement acceptable :</i> - Prélèvement vaginal sans pose de spéculum - Auto prélèvement par patiente Si recherche concomittante de Chlamydia et Mycoplasma genitalium un seul tube suffit

Autres demandes :

Analyse à effectuer	Niveau du prélèvement	Matériel	Remarque
HERPES (HSV)	Lésion vésiculaire Ulcération	Kit M4RT : Ecouvillon (à casser dans milieu de transport)	<p>Première cause d'ulcération génitale (souvent multiples, en bouquet et douloureuses)</p> <p>- Effectuer un grattage cellulaire - si présence de vésicules, percer les vésicules et écouvillonner le plancher des vésicules</p> <p>NB : PCR remboursée dans certains cas : - femme enceinte - atteintes cutanéomuqueuses atypiques</p> <p>Dans les autres cas : HN</p>
PAPILLOMAVIRUS (HPV)	Lésion génito-anale	Kit M4RT : Ecouvillon (à casser dans milieu de transport)	<p>NB : PCR remboursée dans certains cas : - femme entre 30-65 ans - femme < 30 ans si cytologie cervico-vaginale anormale (ex : ASC-US)</p> <p>Dans les autres cas : HN</p>