



## Lavez-vous les mains.

Veillez suivre les étapes 1 à 5 avec le matériel qui vous a été fourni en cas de **prélèvement vaginal** (p2) ; les étapes 1 à 5 avec le matériel qui vous a été fourni en cas de **prélèvement anal** (p3).






En cas de recherche associée de germes classiques et de Chlamydia/gonocoque, suivez les étapes 1 à 5 avec le matériel pour germes classiques, puis répétez-les avec le matériel pour Chlamydia et gonocoque. En cas de recherche de *Mycoplasma genitalium*, effectuez les mêmes étapes que pour la recherche de Chlamydia et de gonocoque (ex : Si recherche de Chlamydia et de *Mycoplasma genitalium*, répétez le prélèvement sur deux écouvillons oranges distincts).

Germes classiques et mycoplasmes	Chlamydia et gonocoque / <i>M.genitalium</i>
 <p>Ouvrez partiellement le sachet contenant l'écouvillon, et enlevez le tube à bouchon violet ou rose.</p>	 <p>Ouvrez partiellement le sachet contenant l'écouvillon. Mettez de côté le tube orange.</p>





**ATTENTION** : si l'écouvillon du prélèvement tombe ou touche une autre surface, si le tube contenant du liquide se renverse, les résultats peuvent être faussés. Demandez un nouveau kit de prélèvement.

Une fois votre prélèvement réalisé, veillez à indiquer vos **nom, prénom et date de naissance**, ainsi que **la date et l'heure** du prélèvement sur le (les) tube(s).

## PRELEVEMENT VAGINAL

<p><u>Etape 1 :</u> Tenir l'écouvillon par la tige, entre le pouce et l'index, au niveau de la bandelette noire. De l'autre main, maintenir les lèvres écartées.</p>	
<p><u>Etape 2 :</u> Introduisez l'écouvillon dans le vagin, sur environ 5 cm, et tournez doucement l'écouvillon pendant environ 30 secondes. Assurez-vous que l'écouvillon touche les parois du vagin. Retirez-le soigneusement et veillez à ce qu'il ne touche aucune surface.</p>	
<p><u>Etape 3 :</u> Tout en tenant bien l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube. <b>Attention :</b> le tube contient du liquide, ne pas le renverser.</p>	
<p><u>Etape 4 :</u> Placez l'écouvillon dans le tube.</p>	
<p><u>Etape 5 :</u> Cassez précautionneusement la tige au niveau du trait noir en la pressant contre le bord du tube. Rebouchez fermement le tube. Notez votre nom, prénom, date de naissance, ainsi que la date et l'heure du prélèvement.</p>	

## PRELEVEMENT ANAL

<p><u>Etape 1 :</u> Tenir l'écouvillon par la tige, entre le pouce et l'index, au niveau de la bandelette noire. L'insérer d'environ 3 à 5 cm dans le canal anal. Faire tourner doucement l'écouvillon pendant 5 à 10 secondes</p>	
<p><u>Etape 2 :</u> Retirez soigneusement l'écouvillon et veillez à ce qu'il ne touche aucune surface. Si l'échantillon est contaminé par d'importantes matières fécales, le jeter et répéter le prélèvement.</p>	
<p><u>Etape 3 :</u> Tout en tenant bien l'écouvillon, enlevez le bouchon du tube. <b>Attention :</b> le tube contient du liquide, ne pas le renverser.</p>	
<p><u>Etape 4 :</u> Placez l'écouvillon dans le tube.</p>	
<p><u>Etape 5 :</u> Cassez précautionneusement la tige au niveau du trait noir en la pressant contre le bord du tube. Rebouchez fermement le tube. Notez votre nom, prénom, date de naissance, ainsi que la date et l'heure du prélèvement.</p>	