

PROTOCOLE PRELEVEMENT NASOPHARYNGE PCR Covid 19

1) Identifier obligatoirement au préalable

le tube avec une étiquette ou de façon manuscrite (nom, prénom et date de naissance)



- 2) Insérer l'écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais (cf. schéma).
- 3) Ecouvillonner l'épithélium des fosses nasales en réalisant des mouvements rotatifs **pendant 10 secondes** en grattant les parois du nasopharynx afin de recueillir des cellules



- 4) Le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif.
- 5) Procéder de même pour l'autre narine avec le même écouvillon
- 6) Décharger l'écouvillon dans le tube puis le frotter au fond du tube et contre les parois **pendant 30 secondes**.
- 7) Une fois déchargé dans le tube, l'écouvillon doit être jeté.
- 8) Placer le tube dans un sachet plastifié

PROTOCOLE PRELEVEMENT NASOPHARYNGE PCR Covid 19

1) Identifier obligatoirement au préalable

le tube avec une étiquette ou de façon manuscrite (nom, prénom et date de naissance)



- 2) Insérer l'écouvillon dans la narine, et le pousser délicatement le plus loin possible, parallèlement au palais (cf. schéma).
- 3) Ecouvillonner l'épithélium des fosses nasales en réalisant des mouvements rotatifs **pendant 10 secondes** en grattant les parois du nasopharynx afin de recueillir des cellules



- 4) Le retirer lentement en lui imprimant un léger mouvement rotatif.
- 5) Procéder de même pour l'autre narine avec le même écouvillon
- 6) Décharger l'écouvillon dans le tube puis le frotter au fond du tube et contre les parois **pendant 30 secondes**.
- 7) Une fois déchargé dans le tube, l'écouvillon doit être jeté.
- 8) Placer le tube dans un sachet plastifié