



## Préconisations patient recueil de selles pour recherche de sang

### Protocole de prélèvement

Le prélèvement s'effectue sur **un flacon transparent** disponible au laboratoire ou à la pharmacie.

Cet examen est réalisé soit sur **1 seul échantillon de selles**, soit sur **3 échantillons de selles émises sur 3 jours consécutifs** (se référer à la prescription du médecin).

Cet examen est à effectuer hors période menstruelle.

- 1- Recueillir les selles dans le flacon stérile : quantité minimale d'une noix, quantité maximale 1/3 du flacon.
- 2- Refermer soigneusement le flacon.
- 3- Identifier le flacon avec votre **nom, prénom et date de naissance**. Noter la **date** et **l'heure du recueil**.
- 4- Mettre le flacon dans le sachet de transport **avec cette fiche complétée**.
- 5- Apporter le prélèvement **le plus rapidement possible** au laboratoire ou à la pharmacie.

### Renseignements administratifs

► **Nom** : ..... ► **Prénom** : ..... ► **Sexe** :  M  F

► **Nom de Naissance** : ..... ► **Date De Naissance** : ..... / ..... / .....

► **N° de Tél** : ..... / ..... / ..... / ..... / .....

► **Adresse** : .....

► **Transmission des résultats** :

Mail → Adresse mail : .....

J'accepte de recevoir des informations du laboratoire Unilabs ou de ses partenaires mandatés par e-mail, et la mise en ligne de mes résultats sur la plateforme sécurisée KIRO. Je reconnais que mon adresse e-mail est personnelle, sécurisée et accessible uniquement aux personnes autorisées.

Laboratoire  Pharmacie, laquelle : .....  Domicile

► **N° Sécurité Sociale** : .....

**Caisse** : ..... **Centre** : .....

► **Nom de la Mutuelle** : ..... **N° AMC / télétrans** : .....

**Numéro d'adhérent** : ..... **Fin de droit** : .....

### Renseignements cliniques et thérapeutiques

► **Date de recueil** : ..... / ..... / ..... ► **Heure de recueil** : ..... H .....

Cocher :

► **Conservation de l'échantillon ?**



Flacon conservé à température réfrigérée (2-8°C), pendant une **durée inférieure à 24h**.

► **Présentez-vous les signes suivants ?**

- Constipation sanglante.
- Hémorroïdes sanglantes.