

**1 / PRELEVEMENT VAGINAL (auto-prélèvement vaginal, voir PRE-INS-043)**

Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débuter un traitement antimicrobien local ou général, à la phase aiguë de la maladie.
- Le prélèvement doit être réalisé avant toute toilette intime.
- Le prélèvement doit être réalisé en dehors des périodes de règles.
- Une abstinence sexuelle de 24-48 h est recommandée.

Consommables nécessaires :

- Ecouvillon COPAN, **bouchon ROSE** (Gram, culture, PCR multiplexe)

Prélèvement :

- Installer la patiente en position gynécologique, talons dans les étriers. Mettre le spéculum en place, sans utiliser de lubrifiant, avec un éclairage adapté.
- Se centrer sur le col, observer l'aspect et l'abondance des sécrétions :

SECRETIONS NULLES / PEU ABONDANTES / ABONDANTES / CAILLEBOTEES / BRUNATRES

Si nécessaire, retirez les mucosités excédentaires de l'orifice cervical et des muqueuses environnantes à l'aide d'un écouvillon de nettoyage. Jetez cet écouvillon.

Écouvillonner les culs de sacs vaginaux (+/- endocol). Décharger vigoureusement l'écouvillon **bouchon ROSE** dans le milieu de transport puis éliminer l'écouvillon.

Identifier les échantillons avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

Noter la **date**, l'**heure** du prélèvement, l'**aspect des sécrétions** et les **renseignements cliniques et thérapeutiques**.

- Leucorrhée ?, Prurit ?, Métrorrhagie ?
- Dépistage IST ?
- Grossesse ? Avant pose d'un stérilet ?
- S'agit-il d'un examen prescrit après un traitement antibiotique ? Si Oui, Lequel ? Débuté le ? Arrêté le ?
- S'agit-il d'un examen prescrit en cours de traitement antibiotique ? Si Oui, Lequel ? Depuis le ?
- Le médecin a-t'il prescrit un traitement antibiotique à commencer après le prélèvement ? Si Oui, lequel ? Pendant combien de jours ?

Préciser le site anatomique prélevé : cervico-vaginal / vaginal

2 / PRELEVEMENT VULVAIRE (code PUSO)

Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débuter un traitement antimicrobien local ou général, à la phase aiguë de la maladie.
- Le prélèvement doit être réalisé avant toute toilette intime.

Chlamydia, Mycoplasme et Trichomonas ne sont pas recherchés au niveau vulvaire.

Consommable nécessaire :

- Ecouvillon ELITECH TRANSWAB AMIES, **bouchon VIOLET** (Gram, culture)

Prélèvement :

- Installer la Patiente en position gynécologique, talons dans les étriers.
- Ecouvillonner la zone vulvaire. Décharger l'écouvillon **bouchon VIOLET** dans le milieu de transport et rompre la tige au point de rupture.

Identifier l'échantillon avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

Noter la **date**, l'**heure** du prélèvement et **les renseignements cliniques et thérapeutiques (voir 1/)**

Préciser le site anatomique prélevé : vulve

3 / RECHERCHE D'UN PORTAGE DE STREPTOCOQUE B HEMOLYTIQUE (RBND)

Consommable nécessaire :

- Ecouvillon ELITECH TRANSWAB AMIES, **bouchon VIOLET** (culture)

Prélèvement :

Examen réalisé **entre 34 et 38 semaines d'aménorrhées** (REMIC 2022) sauf mention contraire sur ordonnance.

- Installer la patiente en position gynécologique, talons dans les étriers.
- **Sans spéculum,**
- Ecouvillonner le tiers inférieur de la cavité vaginale, en écartant manuellement les grandes lèvres vulvaires. Décharger l'écouvillon **bouchon VIOLET** dans le milieu de transport et rompre la tige au point de rupture.

Identifier l'échantillon avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

Noter la **date**, l'**heure** du prélèvement.

Se renseigner sur une éventuelle allergie aux Béta-lactamines.

4 / EXAMEN D'UN STERILET (code REDST)

Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débiter un traitement antimicrobien local ou général, à la phase aiguë de la maladie.

Consommable nécessaire :

- Flacon spécifique

Prélèvement :

- Le retrait du stérilet doit être pratiqué avec le maximum d'asepsie afin de limiter la contamination par la flore commensale vaginale.
- Couper les fils et déposer le stérilet dans le flacon

Identifier l'échantillon avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

Noter la **date**, l'**heure** du prélèvement et **les renseignements cliniques et thérapeutiques**.

- Fièvre ? douleur ?
- Dépistage IST ?
- Résultat du frottis cervico-vaginal ?
- S'agit-il d'un examen prescrit après un traitement antibiotique ? Si Oui, Lequel ? Débuté le ? Arrêté le ?
- S'agit-il d'un examen prescrit en cours de traitement antibiotique ? Si Oui, Lequel ? Depuis le ?
- Le médecin a-t'il prescrit un traitement antibiotique à commencer après le prélèvement ? Si Oui, lequel ? Pendant combien de jours ?

Préciser le matériel prélevé : stérilet

Conservation pré-analytique des échantillons :

A température ambiante :

- Ecouvillon **bouchon VIOLET** ≤ 48h
- Flacon stérilet : ≤ 2h

A 2-8°C :

- Ecouvillon **bouchon ROSE** ≤ 48h