



Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :

- Le prélèvement sera réalisé, si possible, avant de débiter un traitement antibiotique.
- Le prélèvement de pus dit « profond » est réalisé à la suite d'un acte chirurgical ou « d'ouverture » selon les recommandations définies au sein de l'établissement de soins.
- **Les ponctions à la seringue doivent être pratiquées avec le maximum d'asepsie afin d'éviter la contamination par la flore commensale cutanée.**

Echantillon à transmettre au laboratoire :

- Flacon spécifique

L'écouvillonnage est proscrit.

Identifier le flacon avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

Noter la **date**, l'**heure** du prélèvement, l'**origine précise** et les **renseignements cliniques et thérapeutiques**.

- Fièvre?
- Abscess ?
- Kyste ?
- Hématome ?
- S'agit-il d'un examen prescrit après un traitement antibiotique ? Si Oui, Lequel ? Débuté le ? Arrêté le ?
- S'agit-il d'un examen prescrit en cours de traitement antibiotique ? Si Oui, Lequel ? Depuis le ?
- Le médecin a-t'il prescrit un traitement antibiotique à commencer après le prélèvement ? Si Oui, lequel ? Pendant combien de jours ?

Conservation pré-analytique :

Entre 2-8°C, 24h