



Nous vous remercions de respecter les recommandations suivantes :

- Préciser la bactérie multi résistante à rechercher :
 - S aureus résistant à la méticilline (**SARM**),
 - Entérobactéries productrices de Bactamases à spectre élargi (**BLSE**),
 - Entérocoques résistants à la vancomycine (**ERV**),
 - Entérobactéries productrices de carbapénémases (**EPC**).

Consommables nécessaires

- Ecouvillon ELITECH avec milieu de transport **bouchon VIOLET**

Prélèvement :

BLSE, ERV, EPC :

- Ecouvillonnage rectal de préférence
Il faut récupérer sur l'écouvillon des matières fécales en abondance, visibles à l'œil.
1 écouvillon **par recherche de BMR.**
- Selles possible.

SARM :

- Ecouvillonnage au niveau du nez (un seul écouvillon pour les 2 narines),
- Ecouvillonnage des yeux (2 écouvillons distincts),
- Ecouvillonnage des aisselles, du périnée, ...

Identifier l'écouvillon avec Nom, Prénom, Date De Naissance.

Noter la **date, l'heure** du prélèvement, **l'origine** et **les renseignements cliniques et thérapeutiques.**

- Patient source?
- Patient contact ?

Conservation pré-analytique :

Température ambiante, 48h